

CHIRURGIE SACCULECTOMIE : RETRAIT DES GLANDES ANALES CHEZ LE CHIEN

► Qu'est-ce que la sacculéctomie ?

La sacculéctomie est une intervention chirurgicale qui consiste à retirer les glandes anales du chien. Ces petites poches situées de chaque côté de l'anus contiennent un liquide odorant utilisé en communication chez l'animal. Normalement, elles se vident naturellement lorsque le chien défèque. Cependant, chez certains animaux, ce mécanisme ne fonctionne pas correctement. Quand ces glandes se bouchent, s'infectent ou provoquent des abcès à répétition, leur retrait devient la meilleure solution pour le confort et la santé du chien.

► Pourquoi retirer les glandes anales ?

La sacculéctomie est indiquée lorsque votre compagnon présente l'un des problèmes suivants :

- Infections chroniques ou récidivantes des glandes anales
- Formation d'abcès ou de fistules
- Inflammation douloureuse (sacculite)
- Présence de tumeurs (bénignes ou malignes)
- Prurit intense avec léchage et frottement du derrière

Ces troubles sont non seulement douloureux mais peuvent aussi entraîner des complications plus graves si on ne les traite pas à temps.



► Déroulement de la chirurgie

- Anesthésie générale : votre animal est totalement endormi et surveillé tout au long de l'intervention.
- Remplissage des glandes : avant le retrait, le vétérinaire injecte un amalgame spécial dans les glandes. Ce produit permet de les durcir, facilitant ainsi leur extraction complète et sécurisée.
- Incision localisée : une petite incision est réalisée de chaque côté de l'anus pour retirer les glandes durcies.
- Sutures internes ou externes selon la technique choisie.
- Durée : en moyenne 30 à 60 minutes.

C'est une intervention délicate, car les glandes sont situées à proximité de nerfs et muscles contrôlant la continence fécale. Elle doit donc être réalisée par un vétérinaire expérimenté.



► Convalescence et suivi post-opératoire :

Après l'intervention, votre chien peut présenter :

- Une gêne locale (léchage, frottement)
- Des douleurs légères à modérées (prises en charge par des antalgiques)
- Des selles molles ou, plus rarement, une incontinence temporaire

Ces effets secondaires sont généralement transitoires et bien contrôlés avec un traitement adapté.

Soins à la maison :

- Repos strict pendant 10 à 14 jours (évitiez les courses, jeux, escaliers)
- Collierette obligatoire pour éviter le léchage des points
- Médicaments : antibiotiques, anti-inflammatoires et antidouleurs prescrits par le vétérinaire
- Suivi des selles : il est normal d'observer quelques anomalies au début (petites quantités, gêne à la défécation)

Suivi post-opératoire :

En général, aucune visite de contrôle systématique n'est nécessaire. Toutefois, il est important de rester vigilant face à tout signe anormal (douleur excessive, écoulement, gonflement). En cas de doute, contactez votre vétérinaire.

Complications possibles :

Elles sont rares mais peuvent inclure :

- Abscess post-opératoire
- Incontinence fécale (transitoire dans la majorité des cas, permanente très exceptionnellement)
- Formation de fistules (en cas d'infection ou de léchage excessif)

Et après ?

Une fois les glandes retirées et la zone complètement cicatrisée, les animaux retrouvent un confort durable. Les récurrences de sacculite ou d'abcès sont inexistantes, et les troubles du comportement liés à l'inconfort (frottements, léchage, douleurs) disparaissent.

La sacculéctomie permet donc d'améliorer la qualité de vie de votre compagnon lorsqu'un traitement médical ne suffit plus.